

# Carte de traitement anticoagulant oral

## Document of identification for oral anticoagulation

Traitement avec  Marcoumar® (Phenprocoumon) cp à 3 mg  
 Sintrom® (Acenocoumarol) cp à \_\_\_\_\_ mg

Nom / Prénom : \_\_\_\_\_

Rue : \_\_\_\_\_

NPA/Localité : \_\_\_\_\_

Téléphone : privé : \_\_\_\_\_

professionnel/mobile : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_\_\_\_

Indication du traitement anticoagulant : \_\_\_\_\_

Durée prévue du traitement anticoagulant : \_\_\_\_\_

INR cible : \_\_\_\_\_

### Médecin traitant

Nom : \_\_\_\_\_

Rue : \_\_\_\_\_

NPA/Localité : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

**A contacter en cas d'urgence :** \_\_\_\_\_

Mois :                      Année :

Date	Valeur INR	Posologie Nombre de comprimés
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		

Mois :                      Année :

Date	Valeur INR	Posologie Nombre de comprimés
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		

Mois :                      Année :

Date	Valeur INR	Posologie Nombre de comprimés
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		

Mois :                      Année :

Date	Valeur INR	Posologie Nombre de comprimés
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		

Mois :                      Année :

Date	Valeur INR	Posologie Nombre de comprimés
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		

Mois :                      Année :

Date	Valeur INR	Posologie Nombre de comprimés
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		

Mois :                      Année :

Date	Valeur INR	Posologie Nombre de comprimés
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		

Mois :                      Année :

Date	Valeur INR	Posologie Nombre de comprimés
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		

Mois :                      Année :

Date	Valeur INR	Posologie Nombre de comprimés
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		

Mois :                      Année :

Date	Valeur INR	Posologie Nombre de comprimés
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		

Mois :                      Année :

Date	Valeur INR	Posologie Nombre de comprimés
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		

Mois :                      Année :

Date	Valeur INR	Posologie Nombre de comprimés
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		

# Instructions à l'intention des patients

1. Le médicament prescrit par le médecin réduit la capacité normale de coagulation du sang, ce qui permet de baisser nettement le risque d'une formation de caillots (thromboses).
2. Les comprimés doivent absolument être pris conformément aux prescriptions du médecin, de préférence toujours à la même heure. Toute modification de la quantité quotidienne de comprimés sur votre propre initiative est dangereuse.
3. Les effets du médicament doivent être contrôlés par le médecin aux jours prévus. Si cela ne devait pas être possible une fois, il faudrait en prévenir le médecin à l'avance.
4. Suite aux effets du médicament, il se peut que de petites blessures anodines saignent plus longtemps que d'habitude. Ce phénomène n'exige généralement aucune mesure particulière. Dans le cas d'hémorragies importantes (accidents!) ou d'opérations urgentes (incluant l'extraction de dents), le médecin ou le dentiste traitant doit être prévenu que vous suivez un traitement anticoagulant (présenter la carte de traitement anticoagulant!)
5. En cas de saignements ou d'autres maladies, il faut immédiatement informer le médecin qui est responsable du traitement anticoagulant.
6. Aucun autre médicament ne doit être pris sans l'accord du médecin traitant. Ceci s'applique également aux préparations disponibles en vente libre sans ordonnance médicale en pharmacie ou en droguerie (par exemple médicaments contre les douleurs, laxatifs, fortifiants, vitamines, etc.).
7. Dans la mesure du possible, les habitudes de vie et l'alimentation doivent rester inchangées. N'entreprenez pas de régime alimentaire particulier sans en avoir parlé au médecin.
8. Le patient doit toujours porter cette carte de traitement anticoagulant sur lui, en la plaçant de sorte à ce qu'elle puisse être trouvée facilement.